



Actualización Epidemiológica Cólera Mayo 2017

Cólera en las Américas – Resumen de la situación

Entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 14 de 2017 se notificaron 4.871 casos de cólera en Haití, incluidas 69 defunciones; mientras que en la República Dominicana, durante el mismo periodo se notificaron 62 casos sospechosos incluidas dos defunciones.

En Costa Rica los primeros casos de cólera se detectaron en el año 1992 y el último caso en el año 1997.

Ante la situación actual, Costa Rica procedió a activar los planes de preparación y respuesta, se intensificó el sistema de vigilancia y se actualizaron los lineamientos

La promoción de prácticas apropiada de higiene mediante el lavado de manos y consumo de alimentos adecuadamente cocidos y lavados, así como la garantía de dotación de agua segura para consumo humano son condiciones esenciales para prevenir el cólera.

Orientaciones para los Estados Miembros

A pesar de la disminución de los casos notificados de cólera en La Española, la OPS/OMS recomienda a los Estados Miembros que mantengan y fortalezcan la capacidad de vigilancia del cólera a fin de detectar precozmente los casos sospechosos y proporcionar el tratamiento adecuado y prevenir la propagación del cólera. El tratamiento precoz y adecuado mantiene la tasa de letalidad de los pacientes hospitalizados en cifras menores a 1%.

La OPS/OMS alienta a que los Estados Miembros a que continúen con sus esfuerzos, incluido la promoción de higiene y movilización social, para garantizar condiciones adecuadas de saneamiento básico y acceso al agua potable con el fin de reducir el impacto del cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua.

Mayor información:

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2598&Itemid=2291&lang=es