



Boletín Epidemiológico

Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de Costa Rica



Vol. 4 No18 Del 02 de mayo al 08 de mayo del 2004

Tel: (506) 255 1427, 255 2876 Fax: (506) 221 1167 Apartado postal.: 10123-1000

Correo electrónico: anest_ms@netsalud.sa.cr Sitio web: <http://www.netsalud.sa.cr>

Semana 18

EDITORIAL

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, más del 25 % de la población mundial es víctima de trastornos mentales y del comportamiento en algún período en el curso de la vida. Se calcula que en cualquier momento alrededor del 10 % de la población mundial está afectada por los trastornos mencionados, que su impacto económico en la sociedad es de gran magnitud y sus repercusiones en el bienestar y calidad de la vida de las personas es considerable. El impacto que la salud mental alterada produce en la población es muy importante, reflejándose no sólo en el bienestar individual sino también en la economía de los países, su grado de desarrollo y el funcionamiento de los sistemas de salud.

El análisis de la situación de la salud mental en el país, sus consecuencias en el individuo, la familia y la sociedad, los factores que la condicionan y las necesidades que su alteración genera, es una tarea que se impone en la actualidad. * Tomado del libro "Situación actual de la Salud Mental en Costa Rica".

Cuadro 1. Eventos prioritarios de salud de notificación obligatoria en Costa Rica 2003-2004


| Evento | Semana 18 | Año 2004 Semana 17 | Acumulados | Año 2003 Acumulados |
|---|-----------|-----------------------|------------|------------------------|
| Enfermedades inmunoprevenibles | | | | |
| Parálisis flácida | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Rubéola | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Sarampión* | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Tos ferina | 0 | 1 | 6 | 14 |
| Enfermedades transmitidas por vector | | | | |
| Dengue hemorrágico | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Dengue | 84 | 116 | 2376 | 1225 |
| Malaria* | 15 | 8 | 246 | 235 |
| Otras enfermedades | | | | |
| Cólera* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatitis A | 3 | 3 | 50 | 90 |
| Hepatitis B* | 1 | 2 | 29 | 35 |
| Leptospirosis | 0 | 5 | 101 | 73 |
| Meningitis meningocócica* | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Rabia* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIDA* | 0 | 0 | 11 | 28 |
| Sífilis congénita* | 0 | 2 | 42 | 39 |
| Tuberculosis* | 0 | 0 | 0 | 396 |
| Otros eventos y daños | | | | |
| Accidentes de tránsito | 150 | 95 | 4565 | 2985 |
| Intoxicaciones por plaguicidas | 1 | 1 | 113 | 244 |
| Violencia intrafamiliar | 92 | 133 | 3037 | 1925 |

Notas: 0 no se notificaron casos

.. dato no disponible

*Confirmación obligatoria por laboratorio

Mortalidad por Suicidios según año. Costa Rica 1995-2003
(tasa ajustada por 100.000 hab.)



Fuente: INEC-Unidad de Información Estadística M.Salud


Mortalidad por Suicidios en Costa Rica 1995-2003

En Costa Rica en el año 2003 se presentaron un total de 317 suicidios para una tasa de 7,3 por 100.000 habitantes, lo cual representa un incremento del 12.8% de los casos con respecto al año anterior. Con respecto al sexo 264 fueron en hombres (83.3%) y 53 mujeres (16.7%). En cuanto a la provincia de residencia el 30.9 % de los casos corresponden a San José, el 18.6 % a Alajuela y en tercer lugar Puntarenas con 12 %. La provincia donde ocurren menos suicidios es Heredia con 7.3 %.

Cuadro 2. Eventos prioritarios de Salud de notificación obligatoria según Región de Salud. Costa Rica 2003- 2004

| Región | Malaria | | Dengue | | Leptospirosis | | Accidentes de tránsito | | Intoxicación por plaguicidas | |
|------------------|------------------|------------|------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| | Casos acumulados | | Casos acumulados | | Casos acumulados | | Casos acumulados | | Casos acumulados | |
| | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 |
| Brunca | 0 | 2 | 35 | 1 | 21 | 6 | 541 | 222 | 11 | 65 |
| Central Este | 0 | 0 | 13 | 10 | 12 | 4 | 309 | 53 | 13 | 33 |
| Central Norte | 1 | 1 | 297 | 31 | 5 | 3 | 975 | 730 | 14 | 25 |
| Central Sur | 0 | 0 | 137 | 45 | 12 | 11 | 717 | 817 | 30 | 17 |
| Chorotega | 3 | 9 | 368 | 687 | 0 | 2 | 459 | 37 | 15 | 31 |
| Huetar Atlántica | 223 | 181 | 1182 | 73 | 21 | 11 | 573 | 449 | 22 | 42 |
| Huetar Norte | 9 | 19 | 0 | 1 | 17 | 7 | 324 | 4 | 2 | 6 |
| Occidental | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 283 | 203 | 3 | 4 |
| Pacífico Central | 1 | 16 | 344 | 373 | 9 | 27 | 348 | 442 | 3 | 21 |
| Fuera de Área | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 28 | 0 | 0 |
| Totales | 246 | 235 | 2376 | 1225 | 101 | 73 | 4565 | 2985 | 113 | 244 |

Mortalidad por Homicidios según año. Costa Rica 1995,2000-2003
(tasa ajustada por 100.000 hab.)



Fuente: INEC-Unidad de Información Estadística M.Salud

Homicidios en Costa Rica año 2003

En el año 2003 se registraron un total de 285 homicidios de los cuales, 249 fueron hombres (87.4%) y 36 mujeres (11.3%). Con respecto al grupo de edad el que presenta la mayor tasa es el grupo de 25 a 29 años con una tasa de 12.5 por 100.000 hab. Cabe destacar que el 90 % de los casos se dan a partir de los 15 años y hasta los 64 años. En el año 2003 se nota un incremento del 21% de los casos con respecto al año anterior

Realizado por: M.S.c. Rosa Ma. Vargas A.

Comité Editorial

M.S.c. Rosa Ma. Vargas (M.Salud)
 Dra. Teresita Solano (M.Salud)
 Dra. Xiomara Badilla (CCSS)
 Dra. Ana Morice (INCIENSA)
 Dr. Humberto Montiel (OPS/OMS)
 Licda. Xinia Bustamante (OPS/OMS)